

# 感染性胃腸炎(ノロウイルス等)感染が疑われる場合の 【吐物処理の手順】

【使用物品】 すぐ使用できるように、バケツなどにセットしておきましょう!

使い捨て手袋      使い捨てマスク      使い捨てエプロン  
ペーパータオルやぞうきん      バケツ      ビニール袋  
次亜塩素酸系消毒剤 (商品名 : ピューラックス・ハイター 等)

① ★バケツに、**0.1%塩素消毒液**を準備する。

希釈のめやす 水 500mlペットボトル1本+原液キャップ2杯(10ml)

② ★窓を開け換気する。


★使い捨て手袋・マスク・エプロンを  
着用する。



③ ★汚物をペーパータオルで覆い、  
その上に**0.1%塩素消毒液**を撒く。

★ペーパータオルで外側から内側  
に向けて、汚物をすくい上げ、ビ  
ニール袋に入れる。

★ビニール袋に**0.1%塩素消毒液**を  
しみこむ程度に入れ消毒し処分  
する。



④ ★吐物が付着していた場所やその  
周囲を、**0.1%塩素消毒液**をしみ  
こませたペーパータオルやぞうき  
ん等で覆うか、浸すように拭く。

★塩素消毒液は金属を腐食するの  
で、10分後にペーパータオル等で  
水拭きする。

⑤ ★使用したペーパータオル・手袋を  
ビニール袋に入れ、密封し処分す  
る。

★処理後は石けんと流水で十分に  
手を洗う。

※手洗い方法や吐物が付着した衣類の処  
理については、裏面を参考にしてください。

お問い合わせ:新潟大学保健管理センター 五十嵐地区 025-262-6244  
旭町地区 025-227-2040

## 【吐物が付着した衣類の消毒・洗濯】

### ①吐物の除去

- ★使い捨て手袋・マスクを着用する。
- ★吐物を十分に落とす。

### ②消毒

- ★ **0.02%塩素消毒液**に30～60分間浸すか、85℃で1分間以上になるように熱湯消毒をする。

#### 【0.02%塩素消毒液の作り方】

希釈のめやす 水 2ℓペットボトル1本+原液キャップ2杯(10ml)

### ③洗濯

- ★消毒後、他のものと分けて最後に洗濯をする。

## 【手洗いの手順】

ノロウイルスによる感染症は、多くの場合、ウイルスに触れた人の手を介して感染が拡大します。手洗いを習慣づけることが、感染予防の基本です。

- ①石けんをつけ、手のひらをよくこする。



- ④指の間をよく洗う。



- ②手の甲をのばすようにこする。



- ⑤親指と手のひらをねじり洗いする。



- ③指先・爪の間を念入りにこする。



- ⑥手首も忘れずに洗う。



※ ①～⑥で30秒が目安！

- ⑦ その後、十分に水で洗い流しペーパータオルや清潔なタオルでよく拭いて乾かす。

お問い合わせ:新潟大学保健管理センター 五十嵐地区 025-262-6244  
旭町地区 025-227-2040